

NAVODILO ZA ODVZEM PERIANALNEGA ODTISA

GLISTE – OTROŠKA PODANČICA

Otroška podančica (lat. Enterobius vermicularis/Oxyuris vermicularis) je najpogostejši povzročitelj parazitske črevesne bolezni. Pogostejša je pri otrocih kot pri odraslih.

Podančice so dolge do 1 cm. Običajno ponoči, ko otrok spi, zleze samica parazita do zadnjične odprtine in začne odlagati jajčeca, kar otroka zelo srbi, zato se praska, posredno ga zaradi tega muči nespečnost.

S praskanjem zanese jajčeca za nohte in se ponovno okuži.

Jajčeca podančic v vzorcu blata običajno ne najdemo, ker se jajčeca ne izločajo z blatom. Samica parazita leže jajčeca v tople in vlažne kožne gube zunaj danke, kjer ostanejo prilepljena. Dokažemo jih s pomočjo celofanskega brisa (selotejp) perianalnega področja.

Kako odvzamemo bris?

- V ambulanti ali laboratoriju dobite objektno stekelce.
- Rabite še PROZOREN selotejp, ne sme biti matiran!
- Večer, pred spanjem (pred odvzemom), otroku ritko umijete, vendar je NE smete namazati s kremo. Koža mora biti suha.
- Bris odvzamete zjutraj, **pred uriniranjem ali iztrebljanjem in pred jutranjim umivanjem!**



1) Odrežete košček prozornega selotejpa, 10-12 cm (dolžina stekelca) in z lepljivo stranjo pritisnete na kožo okoli zadnjika.



Pri tem si pomagajte z žličko ali z orokavičenim prstom.

2) Trak nalepite na objektno stekelce tako, da med površino predmetnega stekelca in selotejpa ni mehurčkov zraka.



Pri pravilnem odvzemu se na stekelcu vidi odtis anusa (zadnjika) v obliki rozete



Paziti morate, da se stekelce ne razbije ali selotejp zmečka.

Objektno steklo dajte v kuverto in prinesite v laboratorij.

Na kuverto obvezno napišite:

Ime in priimek, rojstne podatke, datum in uro odvzema brisa.

POMEMBNO: Od odvzema do analize brisa **NE SME preteči več kot 5 ur!**

Izvid dobite še isti dan!